

APPROPRIATEZZA DELLE STATINE: ANALISI DELLE PRESCRIZIONI ATTRAVERSO IL RECORD-LINKAGE

3^a CONFERENZA NAZIONALE GIMBE®
Bologna 8 febbraio 2008

Elena Mittone, Lorenza Ferraro


BACKGROUND

Le statine sono medicinali molto utilizzati e che hanno avuto un forte incremento dei consumi negli anni.

La nota AIFA 13 identifica quali sono i "soggetti a rischio elevato" per i quali risulta appropriato programmare una terapia a carico del SSN.


L'analisi delle prescrizioni farmaceutiche può fornire dati utili per valutare impatto ed appropriatezza dei trattamenti a vari livelli di interesse.

I 15 PRINCIPI ATTIVI MAGGIORMENTE PRESCRITTI A CARICO SSN IN ITALIA NEL 1° SEMESTRE 2007 (DDD X 1000 AB/DIE)



DATI DATABASE SFERA

I 15 PRINCIPI ATTIVI MAGGIORMENTE PRESCRITTI IN ITALIA A CARICO DEL SSN NEL PRIMO SEMESTRE 2007 PER SPESA (EURO PER 1000 ABITANTI RES)



DATI DATABASE SFERA

OBIETTIVI

☛ mettere a confronto i dati d'uso dei farmaci ipolipemizzanti nell'ASL 4 di Torino con i dati regionali e nazionali;

☛ descrivere la popolazione dell'ASL4 in trattamento con ipolipemizzanti, valutando l'appropriatezza prescrittiva sulla base delle indicazioni AIFA.







METODI






☛ confronto delle prescrizioni di ipolipemizzanti relative al periodo 2001-2007 dell'ASL4 di Torino, della Regione Piemonte e dell'Italia tramite banca dati SFERA

☛ identificazione dei pazienti trattati con ipolipemizzanti nell'ASL4 di Torino, nell'anno 2006 e primo semestre 2007 tramite linkage di banche dati

☛ caratterizzazione dei pazienti trattati per età, sesso e comorbidità

☛ analisi dei dati per focalizzare se a pazienti a maggiore rischio cardiovascolare corrisponda maggiore trattamento con ipolipemizzanti





Azienda Regionale ASL TO2 - Servizio Farmaceutico Territoriale EX ASL4

LIMITI

- Non tutti i pazienti richiedono l'esenzione del ticket correlata alla patologia in studio con una sottostima del numero di pazienti affetti da tale patologia
- I dati sono relativi solo alla prescrizione ed all'acquisto del medicinale in farmacia, mentre non si è certi che il paziente abbia effettivamente assunto la terapia
- Non ci sono dati di efficacia e di effettivo raggiungimento del goal terapeutico

CONCLUSIONI

⚡ Lo studio ha fornito un quadro completo della prescrizione degli ipolipemizzanti e di alcune caratteristiche della popolazione in trattamento

⚡ In coerenza con le carte del rischio cardiovascolare del progetto Cuore, risultano più trattati pazienti di sesso maschile a rischio maggiore

⚡ L'età di trattamento è fortemente spostata verso anziani e grandi anziani

⚡ Tuttavia la popolazione maggiormente a rischio, individuata nella nota 13 con la prevenzione secondaria, presenta percentuali di trattamento con statine piuttosto limitate

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

